

Flora Suisse

Fiche Technique

La prairie fleurie pour les sols pauvres en éléments nutritifs



- ✓ Valeur écologique
- ✓ Adaptabilité aux conditions
- ✓ Plus de 50 espèces



Description

Flora Suisse – La prairie fleurie pour les sols pauvres en éléments nutritifs

Caractéristiques du produit

Ce mélange est inspiré de la traditionnelle prairie de fromental. Le mélange Flora Suisse préfère les terrains ensoleillés, secs et pauvres en nutriments mais peut s'adapter à différents types de sol grâce aux plus de 50 espèces de plantes qu'il contient. La prairie fleurie offre un spectacle multicolore. Les nombreuses plantes à fleurs indigènes attirent les insectes et les papillons et leur offrent un habitat adapté.



Les semences des fleurs sauvages proviennent à 100 % de multiplication CH.

N° d'art.	Unités	Range	Pcs/carton	Pcs/palette	Groupe de prix d'art.	EAN-Code
24941	500 g	25 m ²	6	384	1575	7 611226 032145
25117	88 x 0,5 kg	—	1	4 Displays	1575	7 611226 033531
23994	10 kg	500 m ²	—	50	1575	7 611226 323380

Utilisation

Parcs, jardins familiaux, surfaces de présentation

Hauteur de végétation

Jusqu'à 100 cm

Exposition


De préférence, un terrain ensoleillé avec un sol peu profond et pauvre en nutriments. Le mélange ne se prête que modérément aux sols riches, humides et ombragés. La composition florale s'exprime selon le terrain.

Eric Schweizer SA

Case postale 150, CH-3602 Thoune, Tél. +41 33 227 57 21
commande@ericschweizer.ch, www.ericschweizer.ch

Flora Suisse

Fiche Technique



Application et entretien

- 1. Préparation du sol.** Éliminer complètement l'ancienne végétation. Ameublir le sol jusqu'à 10–15 cm de profondeur. Incorporer du sable lorsque le sol est très riche en éléments nutritifs. Aplanir la surface.
- 2. Ensemencement.** Idéal entre la mi-avril et la mi-juin. Répandre les semis de façon homogène à l'aide de l'épandeur de la boîte (20 g/m²). Les semences sont mélangées avec un support de semis qui permet d'obtenir un semis uniforme. Tasser le semis à l'aide d'un rouleau ou le dos d'une pelle.
- 3. Entretien lors de la 1^{re} année.** Aucun arrosage ni sarclage nécessaire. Lorsque les plantes ont atteint env. 40 cm, tondre à une hauteur de 8–10 cm. Éliminer les déchets de tonte. Arracher les mauvaises herbes comme les rumex et les chardons. Prévenir l'invasion des limaces.
- 4. Entretien à partir de la 2^e année.** 1 à 3 tontes par an. 1^{re} tonte idéalement après la floraison des marguerites (début-mi juin). Hauteur de tonte : 8–10 cm. Arracher les mauvaises herbes comme les rumex et les chardons. Prévenir l'invasion des limaces. Après avoir été semé, la prairie fleurie ne fleurit qu'à partir de la deuxième année. Aucun engrais nécessaire.

Composition (latin/français)

Flours sauvages

Achillea millefolium
Anthriscus sylvestris
Anthyllis vulneraria
Aquilegia vulgaris
Campanula glomerata
Campanula patula
Campanula rapunculus
Cardamine pratensis
Carum carvi
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Clinopodium vulgare
Crepis biennis
Daucus carota
Galium mollugo
Galium verum
Geranium pratense
Hieraceum pilosella
Knautia arvensis
Lathyrus pratensis
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Malva moschata
Onobrychis viciifolia
Origanum vulgare
Picris hieracioides
Plantago lanceolata
Primula veris
Prunella vulgaris
Ranunculus bulbosus
Rhinanthus alectorolophus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor

Achillée millefeuille
 Cerfeuil des prés
 Anthyllide vulnéraire
 Ancolie commune
 Campanule agglomérée
 Campanule étalée
 Campanule raiponce
 Cardamine des prés
 Cumin des prés
 Centaurée jacée
 Centaurée scabieuse
 Sarriette clinopode
 Crépide bisannuelle
 Carotte sauvage
 Gaillet commun
 Gaillet jaune
 Géranium des prés
 Epervière piloselle
 Knautie des champs
 Gesse des prés
 Liondent d'automne
 Liondent hispide
 Marguerite
 Mauve musquée
 Esparcette à feuilles de vesce
 Origan vulgaire
 Picride amère
 Plantain lancéolé
 Primevère officinale
 Brunelle commune
 Renoncule bulbeuse
 Rhinanthé velu
 Sauge des prés
 Petite pimprenelle

Scabiosa columbaria
Silene dioica
Silene flos-cuculi
Silene nutans
Silene vulgaris
Stachys officinalis (Betonica of.)
Thymus pulegioides
Tragopogon pratensis
subsp. orientalis
Veronica chamaedrys
Vicia cracca

Graminées

Arrhenatherum elatius
Bromus erectus
Bromus inermis
Bromus secalinus
Cynosurus cristatus
Festuca ovina duriuscula
Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Phleum pratense
Poa pratensis
Trisetum flavescens

Scabieuse colombarie
 Silène dioïque
 Silène fleur de coucou
 Silène penché
 Silène enflé
 Epiaire officinale
 Thym pouliot
 Salsifis d'orient

Véronique petit chêne
 Vesce à feuilles grêles

Avoine élevée
 Brome dressé
 Brome inerme
 Brome faux-seigle
 Crételle des prés
 Fétuque ovine durette
 Fétuque rouge gazonnante
 Fétuque rouge traçante
 Fétuque rouge demi-traçante
 Fléole des prés
 Pâturin des prés
 Avoine jaunâtre

Activateur de sol 100 % organ.
 Support de semis

La composition peut varier légèrement selon la moisson.

Date : février 2018

Eric Schweizer SA

Case postale 150, CH-3602 Thoune, Tél. +41 33 227 57 21
 commande@ericschweizer.ch, www.ericschweizer.ch