

Nutriflor

Fiche Technique

Prairie fleurie pour sols fertils



- ✓ **Concurrentiel**
- ✓ **Facilité d'entretien**
- ✓ **Plus de 40 espèces**



Description




Nutriflor – Prairie fleurie pour sols fertils

Caractéristiques du produit

Avec le mélange Nutriflor, il est possible de créer une prairie fleurie multicolore sur les terrains riches en éléments nutritifs. Les fleurs qu'il contient concurrencent les espèces sur des terrains riches en éléments nutritifs. Le paquet contient un mélange séparé de fleurs et de graminées. Les fleurs doivent être semées au moins six mois avant les graminées.



Les semences des fleurs sauvages proviennent à 100 % de multiplication CH.

N° d'art.		Unités	Range	Pcs/carton	Pcs/palette	Groupe de prix d'art.	EAN-Code
24942		500 g	25 m ²	6	384	1575	7 611226 032152
25118		88 x 0,5 kg	—	1	4 Displays	1575	7 611226 033548
21375		10 kg	500 m ²	—	50	1575	7 611226 321911

Utilisation

Parcs, jardins familiaux, surfaces de présentation

Hauteur de végétation

Jusqu'à 100 cm

Exposition


Les sites ensoleillés et chauds verront se développer une plus grande variété d'espèces. Mais les terrains légèrement ombragés peuvent, eux aussi, être convertis en prairie fleurie.

Eric Schweizer SA

Case postale 150, CH-3602 Thoune, Tél. +41 33 227 57 21
commande@ericschweizer.ch, www.ericschweizer.ch

Nutriflor

Fiche Technique



Application et entretien

- 1. Préparation du sol.** Éliminer complètement l'ancienne végétation. Ameublir le sol jusqu'à 10–15 cm de profondeur. Aplanir la surface.
- 2. Ensemencement.** Semer les fleurs sauvages avant les graminées. Idéalement, les fleurs sauvages entre la mi-avril et la mi-juin et les graminées au début de l'automne. Répandre les semis de façon homogène à l'aide de l'épandeur de la boîte (20 g/m²). Les semences sont mélangées avec un support de semis qui permet d'obtenir un semis uniforme. Tasser le semis à l'aide d'un rouleau ou le dos d'une pelle.
- 3. Entretien lors de la 1^{re} année.** Aucun arrosage ni sarclage nécessaire. Lorsque les plantes ont atteint env. 40 cm, tondre à une hauteur de 8–10 cm. Éliminer les déchets de tonte. Arracher les mauvaises herbes comme les rumex et les chardons. Prévenir l'invasion des limaces.
- 4. Entretien à partir de la 2^e année.** 1 à 3 tontes par an. 1^{re} tonte idéalement après la floraison des marguerites (début-mi juin). Hauteur de tonte : 8–10 cm. Arracher les mauvaises herbes comme les rumex et les chardons. Prévenir l'invasion des limaces. Après avoir été semé, la prairie fleurie ne fleurit qu'à partir de la deuxième année. Aucun engrais nécessaire.

Composition (latin/français)

Fleurs sauvages

Achillea millefolium
Ajuga reptans
Anthyllis vulneraria
Bellis perennis
Campanula patula
Campanula rotundifolia
Cardamine pratensis
Carum carvi
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Clinopodium vulgare
Crepis biennis
Daucus carota
Galium mollugo
Geranium pratense
Knautia arvensis
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Onobrychis viciifolia
Picris hieracioides
Plantago lanceolata
Primula veris
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Scabiosa columbaria
Silene flos-cuculi
Silene vulgaris
Tragopogon pratensis
subsp. orientalis

Achillée millefeuille
 Bugle rampante
 Anthyllide vulnéraire
 Pâquerette vivace
 Campanule étalée
 Campanule à feuilles rondes
 Cardamine des prés
 Cumin des prés
 Centaurée jacée
 Centaurée scabieuse
 Sarriette clinopode
 Crépide bisannuelle
 Carotte sauvage
 Gaillet commun
 Géranium des prés
 Knautie des champs
 Liondent hispide
 Marguerite
 Esparcette à feuilles de vesce
 Picride amère
 Plantain lancéolé
 Primevère officinale
 Renoncule bulbeuse
 Sauge des prés
 Petite pimprenelle
 Scabieuse colombarie
 Silène fleur de coucou
 Silène enflé
 Salsifis d'orient
 Support de semis

Graminées

Arrhenatherum elatius
Bromus erectus
Bromus inermis
Bromus secalinus
Cynosurus cristatus
Festuca ovina duriuscula
Festuca rubra commutata
Festuca rubra rubra
Festuca rubra trichophylla
Phleum pratense
Poa pratensis
Trisetum flavescens

Avoine élevée
 Brome dressé
 Brome inerme
 Brome faux-seigle
 Crételle des prés
 Fétuque ovine durette
 Fétuque rouge gazonnante
 Fétuque rouge traçante
 Fétuque rouge demi-traçante
 Fléole des prés
 Pâturin des prés
 Avoine jaunâtre

La composition peut varier légèrement selon la moisson.