




Papillon

Fiche Technique

Un habitat pour les papillons



-  **Source d'aliments**
-  **Floraison colorée**
-  **Plus de 50 espèces**



Description





Papillon – Un habitat pour les papillons

Caractéristiques du produit

Le mélange Papillon contient un grand nombre de fleurs et de graminées qui servent de base d'alimentation des papillons et à la pondaison. Le mélange est multicolore, varié et facile à entretenir. Il n'est tondu qu'une seule fois à la fin de l'automne.



Les semences des fleurs sauvages proviennent à 100 % de multiplication CH.

N° d'art.		Unités	Range	Pcs/carton	Pcs/palette	Groupe de prix d'art.	EAN-Code
24946		500 g	25 m²	6	384	1575	
25122		88 x 0,5 kg	–	1	4 Displays	1575	

Utilisation

Parcs, jardins familiaux, surfaces de présentation

Hauteur de végétation

Jusqu'à 100 cm

Exposition


Cette diversité d'espèces apprécie les terrains ensoleillés avec un sol moyennement pauvre à pauvre en nutriments. Plus le terrain est ombragé et riche, moins les espèces sont nombreuses.

Eric Schweizer SA

Case postale 150, CH-3602 Thoune, Tél. +41 33 227 57 21
commande@ericschweizer.ch, www.ericschweizer.ch

Papillon

Fiche Technique



Application et entretien

- 1. Préparation du sol.** Éliminer complètement l'ancienne végétation. Ameublir le sol jusqu'à 10–15 cm de profondeur. Incorporer du sable lorsque le sol est très riche en éléments nutritifs. Aplanir la surface.
- 2. Ensemencement.** Idéal entre la mi-avril et la mi-juin. Répandre les semis de façon homogène à l'aide de l'épandeur de la boîte (20 g/m²). Les semences sont mélangées avec un support de semis qui permet d'obtenir un semis uniforme. Tasser le semis à l'aide d'un rouleau ou le dos d'une pelle.
- 3. Entretien lors de la 1^{re} année.** Aucun arrosage ni sarclage nécessaire. Lorsque les plantes ont atteint env. 40 cm, tondre à une hauteur de 8–10 cm. Éliminer les déchets de tonte. Arracher les mauvaises herbes comme les rumex et les chardons. Prévenir l'invasion des limaces.
- 4. Entretien à partir de la 2^e année.** 1 tonte par an (entre fin août et mi-novembre). Hauteur de tonte: 8–10 cm. Arracher les mauvaises herbes comme les rumex et les chardons. Prévenir l'invasion des limaces. Après avoir été semée, la prairie pour papillons ne fleurit qu'à partir de la deuxième année. Aucun engrais nécessaire.

Composition (latin/français)

Flours sauvages

<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire pétiolée
<i>Anthemis tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Anthyllide vulnéraire
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Buptharme à feuilles de saule
<i>Cardamine pratensis</i>	Cardamine des prés
<i>Carum carvi</i>	Cumin des prés
<i>Centaurea jacea</i>	Centauree jaccée
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centauree scabieuse
<i>Cynoglossum officinale</i>	Cynoglosse officinale
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Oeillet des Chartreux
<i>Dianthus deltoides</i>	Oeillet à delta
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés
<i>Galium mollugo</i>	Gaillet commun
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune
<i>Helianthemum nummularium</i>	Hélianthème nummulaire
<i>Hieraceum aurantiacum</i>	Epervière orangée
<i>Hieraceum pilosella</i>	Epervière piloselle
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Espartette à feuilles de vesce

<i>Origanum vulgare</i>	Origan vulgaire
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Boucage saxifrage
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés
<i>Sanguisorba minor</i>	Petite pimprenelle
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale
<i>Scabiosa columbaria</i>	Scabieuse colombarie
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse
<i>Silene flos-cuculi</i>	Silène fleur de coucou
<i>Silene nutans</i>	Silène penché
<i>Silene vulgaris</i>	Silène enflé
<i>Thymus pulegioides</i>	Thym pouliot
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle violet longue durée
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à feuilles grêles
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies
<i>Viola odorata</i>	Violette odorante

Graminées

<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante
<i>Briza media</i>	Brize intermédiaire
<i>Bromus erectus</i>	Brome dressé
<i>Festuca ovina duriuscula</i>	Fétuque ovine durette
<i>Festuca rubra commutata</i>	Fétuque rouge gazonnante
	Support de semis

La composition peut varier légèrement selon la moisson.